

جدول ارزیابی ریسک سقوط در کودکان معیار هامپی دامپی (Humpy Dumpy)

امتیاز	معیار	ریسک فاکتور
۴	سن > ۳ سال	سن
۳	سن ۳-۷ سال	
۲	سن ۷-۱۳ سال	
۱	سن ۱۳ سال یا < ۱۳ سال	
۲	پسر	جنس
۱	دختر	
۴	تشخیص های نورولوژیک (مانند صرع ، ضربه به سر ، هیدروسفالی ، فلج مغزی و	تشخیص بالینی (اگر بیمار چندین تشخیص اولیه و ثانویه داشته باشد ، امتیاز دهی بر مبنای حادث ترین تشخیص است مثلا برای بیماری که مبتلا به کم خونی داسی شکل است و سابقه فلج مغزی یا صرع دارد ، از این قسمت امتیاز ۴ دریافت می کند)
۳	اختلال در اکسیژن رسانی (مانند تشخیص تنفسی ، دهیدراتاسیون ، آنمی ، بی اشتها ، سنکوپ و ..	
۲	اختلالات روانی - رفتاری (اختلالات خلقی مانند افسردگی شدید ، اختلال دو قطبی و ..)	
۱	تشخیص های دیگر که شامل موارد بالا نباشد	
۳	بیمار به ناتوانی های جسمی خود آگاهی ندارد (مثلا بیمار شیر خوار است یا دچار آسیب مغزی است)	اختلالات شناختی
۲	بیمار به ناتوانی های جسمی خود آگاهی دارد ولی به دلیل مشکل فعلی که برایش ایجاد شده است ، (مثلا هایپو گلیسمی و یا ضعف) محدودیت ها و ناتوانایی های خود را فراموش کرده است یا کودک تحت درمان با آرام بخش یا تحت تاثیر بیهوشی است .	
۱	بیمار به ناتوانی های جسمی خود آگاهی کامل دارد.	
۴	سابقه سقوط در بستری فعلی یا بستری قبلی دارد .	
۴	بیمار کودک نو پا یا شیر خواری است که در تخت مناسب کودک فرار نکرده است	فاکتور های محیطی
۳	بیمار از وسایل کمک حرکتی مانند ویلچر ، عصا یا واکر استفاده می کند .	
۲	بیمار کودک یا شیر خواری است که در تخت مخصوص کودک قرار گرفته است ، اما در اتاق چند تخته ، با نور کم و وسایل و تجهیزات پزشکی متعدد است.	
۱	بیمار بزرگتر از ۳ سال که در تخت است .	
۳	بیماری که جهت انجام تست های تشخیصی به صورت سرپایی مراجعه کرده است .	
۲	تا ۲۴ ساعت بعد از عمل جراحی	
۲	تا ۴۸ ساعت بعد از عمل جراحی	پاسخ به جراحی ، مسکن و یا داروهای بیهوشی
۱	بیش از ۴۸ ساعت گذشته است یا اصلا انجام نشد	
۳	استفاده همزمان از دارو های زیر - مسکن ها (به غیر از بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه که کاملاً بیهوش و فلج شده اند) - خواب آور ها و آرام بخش ها - باریتورات ها - فنوتیازین - ضد افسردگی ها - ملین ها و یا دیورتیک ها - نار کوتیک ها	
۲	فقط یکی از دارو های بالا را دریافت کند	دارو های مصرفی
۱	هیچ یک از دارو های بالا را استفاده نکند یا اصلا دارو دریافت نکند	

بیماران در خطر بالای سقوط: امتیاز ۱۲ و یا بیشتر

بیماران در خطر پایین سقوط: امتیاز ۱-۷